

Comparaison et limites des différents examens d'imagerie de la statique pelvi-périnéale

Jean-François Lapray

Centre de radiologie, Lyon, lapray@wanadoo.fr

I Comparaison cystographie, colpocystodéfécographie, échographie et IRM dynamiques

- 1) étage antérieur
 - mobilité cervico-urétrale, col, détrusor, RPM
 - miction et urètre
 - périurètre et B.S.U.
- 2) étages moyen et postérieur
 - dôme vaginal et utérus
 - colpocèles postérieures, pathologie ano-rectale
- 3) qualité de la poussée et compétition des prolapsus
- 4) complications chirurgicales
- 5) moyens de fixité

II Messages

- examens patient- et opérateur- dépendants (incidence de la préparation et rigueur dans la réalisation des différents examens)
- limites (périnée postérieure pour échographie, incontinence urinaire et pathologie anorectale pour IRM, péri-urètre et élytrocèle pour colpocysto-défécographie) pièges et échecs (IRM dynamique) des différentes techniques
- indications dans l'incontinence urinaire et les prolapsus « isolés » ou « récidivants » et nécessité de corrélation avec l'examen clinique et le BUD

III Quelques références

Recommandations pour l'exploration d'une incontinence urinaire féminine non neurologique.

Prog Urol., 2007,17 : 1231-1300

Hermieu J.F., Cortesse A., Cardot V., Le Normand L., Lapray J.F., Ballanger P., Monneins F. et le Comité d'Urologie et de Pelvi-périnéologie de la Femme de l'Association Française d'Urologie

Imagerie des prolapsus pelvipérinéaux

Pelvi-périnéologie 2007, 2, 227-243

J.F. Lapray

Imagerie de la vessie et de la dynamique pelvienne de la femme

Collection d'imagerie radiologique, 256 p, Masson Ed., Paris, 1999.

J.F. Lapray

